

Esercitazione di Matematica – Test di Autovalutazione

Contenuti: operazioni tra insiemi; operazioni con i radicali; disequazioni di secondo grado e frazionarie; equazioni e disequazioni irrazionali; espressioni, equazioni e disequazioni goniometriche

1. Dati gli intervalli $A = [2,7)$, $B = (7,9]$, determinare $A \cap B, A \cup B$

Suggerimento: Per trovare l'intersezione $A \cap B$ devo risolvere un sistema

$$\begin{cases} 2 \leq x < 7 \\ 7 < x \leq 9 \end{cases}$$

Per trovare $A \cup B$ devo scrivere gli insiemi uno di seguito all'altro

2. Dati gli intervalli $A = [3,10)$, $B = [5,+\infty)$, $C = (2,8]$, $D = (-\infty,7]$, determinare $(A \cap B) \cap (C \cup D)$

3. Calcolare: $\sqrt{8} + \sqrt{18}$, $\sqrt{a^3 \sqrt{a}}$: a

4. Risolvere le seguenti equazioni di primo o di secondo grado (attenzione al dominio quando si è in presenza di equazioni frazionarie, occorre verificare se tutte le soluzioni trovate sono accettabili)

$$1 \quad \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{9} = \frac{x}{3}(3x - 2) \quad [S = \left\{-\frac{1}{12}\right\}]$$

$$2 \quad 3 - \frac{5}{x-1} + \frac{2}{x+1} = -\frac{3x^2}{1-x^2} \quad [S = \left\{-\frac{10}{3}\right\}]$$

$$3 \quad \frac{x}{x^2 - 2x + 1} + \frac{5}{2x - 2} = \frac{x+3}{x^2 - 1} - \frac{2}{x-1} \quad [S = \left\{\frac{1 \pm 2\sqrt{7}}{9}\right\}]$$

$$4 \quad \frac{x+9}{x^2 - 9} + 1 = \frac{x}{x+2} \quad [S = \left\{0, -\frac{11}{3}\right\}]$$

$$5 \quad 1 + \frac{3x-1}{x+2} = \frac{x+1}{2-x} \quad [S = \left\{0, \frac{4}{5}\right\}]$$

$$6 \quad \frac{x+2}{6x+6} + \frac{6}{x^2 - x - 2} = \frac{2(x+1)}{3x-6} \quad [S = \left\{-\frac{14}{3}\right\}]$$

$$7 \quad \frac{11-x}{(3-x)(x+1)} + \frac{3x}{x+1} = \frac{2x+1}{x-3} + \frac{x^2-1}{x^2-2x-3} \quad [S = \emptyset]$$

$$8 \quad \frac{2+x}{5(x+1)} = \frac{2x+1}{x-2} - \frac{x^2-x}{x^2-x-2} \quad [S = \left\{-\frac{9}{2}, -\frac{1}{2}\right\}]$$

5. Risolvere le seguenti equazioni di grado superiore al secondo:

$$9 \quad 2x^3 - 5x^2 - 3x = 0 \quad [S = \left\{-\frac{1}{2}, 0, 3\right\}]$$

$$10 \quad 4x^3 - 7x^2 - 7x + 4 = 0 \quad [S = \left\{-1, \frac{11 \pm \sqrt{57}}{8}\right\}]$$

$$12 \quad 6x^4 - 13x^2 + 5 = 0 \quad [S = \left\{\pm \frac{1}{3}\sqrt{15}, \pm \frac{1}{2}\sqrt{2}\right\}]$$

$$13 \quad 4x^4 + 13x^3 - 13x^2 - 4x = 0 \quad [S = \left\{-4, -\frac{1}{4}, 0, 1\right\}]$$

$$15 \quad \frac{x^2+3}{x^2+1} - \frac{x^2-1}{x^2-3} = 2 \quad [S = \{\pm 1\}]$$

$$19 \quad \frac{x^2-1}{x^2+2x} - x = \frac{x^2-3}{x} - 1 \quad [S = \left\{-1, \pm \frac{\sqrt{10}}{2}\right\}]$$

6. Risolvere le seguenti **disequazioni** di secondo grado:

$$2x^2 - 3x + 1 \leq 0 \quad 4x^2 - 12x + 9 > 0 \quad -2x^2 + 12x - 5 > 0$$

7. Risolvere le **disequazioni** numeriche frazionarie:

$$26 \quad \frac{3x^2 + 1}{3x - 2} \leq x \quad \left[-\frac{1}{2} \leq x < \frac{2}{3} \right]$$

$$27 \quad \frac{4x^2 + x + 4}{3x} > 1 + x + \frac{x + 3}{4} \quad [0 < x < 1 \vee x > 16]$$

$$28 \quad \frac{2x^2 - 5x}{x^2 - 4x + 3} > 0 \quad \left[x < 0 \vee 1 < x < \frac{5}{2} \vee x > 3 \right]$$

$$30 \quad 9x^4 - 46x^2 + 5 \leq 0 \quad \left[-\sqrt{5} \leq x \leq -\frac{1}{3} \vee \frac{1}{3} \leq x \leq \sqrt{5} \right]$$

8. Determinare l'insieme delle soluzioni delle seguenti **disequazioni frazionarie**, stabilendo se si tratta di un insieme limitato oppure no:

a. $\frac{1}{x^2 + 4} < -x^2 - 1$

b. $\frac{3x + 1}{x - 1} > \frac{2x^3 + 7x}{x^2 - x}$

c. $1 + x > \frac{x}{|x|}(1 - x)$

9. Risolvere i **sistemi di disequazioni**:

$$39 \quad \begin{cases} 8x^2 - 1 > 0 \\ x^2 + x + 6 > 0 \end{cases} \quad \left[x < -\frac{\sqrt{2}}{4} \vee x > \frac{\sqrt{2}}{4} \right]$$

$$40 \quad \begin{cases} \frac{2 - x}{x - 3} \leq 0 \\ x^3 + x - x^2 - 1 > 0 \end{cases} \quad [1 < x \leq 2 \vee x > 3]$$

$$41 \quad \begin{cases} \frac{x(x^2 - 5)}{x + 1} < 0 \\ \frac{x^2}{x - 2} + 1 > 0 \end{cases} \quad [-2 < x < -1 \vee 0 < x < 1 \vee 2 < x < \sqrt{5}]$$

10. Risolvere le **equazioni irrazionali**

$$44 \quad \sqrt{2x - 4} = 8 - \frac{3}{2}x \quad [S = \{4\}]$$

$$45 \quad 1 + \sqrt{x^2 - 9} = x + 2 \quad [S = \emptyset]$$

$$46 \quad \sqrt[3]{2x + 3x^2} - 3x = 0 \quad \left[S = \left\{ 0, \frac{1}{3}, -\frac{2}{9} \right\} \right]$$

$$47 \quad \frac{1}{2\sqrt{x-1}} + \frac{\sqrt{x-1}}{x} = 1 \quad [S = \{2\}]$$

$$48 \quad \frac{2}{\sqrt{x-1}} = -1 \quad [S = \emptyset]$$

11. Determinare l'insieme delle soluzioni dell'**equazione irrazionale**: $\sqrt{x-5} - \sqrt{x-10} = 1$

Impongo prima l'esistenza delle due radici di indice pari per trovare il dominio dell'equazione

$$\begin{cases} x - 5 \geq 0 \\ x - 10 \geq 0 \end{cases} \quad \text{Poi sposto una radice da una parte ed elevo al quadrato...dopo dovrò controllare l'accettabilità delle soluzioni trovate}$$

12. Determinare l'insieme delle soluzioni delle seguenti **disequazioni irrazionali**:

a. $1 + \sqrt{1+x} > x$

b. $\sqrt{x^2 - 2x} > x - 3$

c. $\sqrt{x^2 - 16} > |x + 1|$

d. $\frac{\sqrt{x+2}}{x-4} \leq 1$

e. $\frac{\sqrt{x^2 + x - 2}}{x-3} > 1$

13. Determinare l'insieme delle soluzioni della seguente **disequazione con i moduli**: $\left| \frac{x+1}{x-1} \right| < 4$

14. Esercizio risolto

Stabilisci se E , l'insieme delle soluzioni della seguente disequazione

$$x^2 - 2 \left| x^2 + \frac{1}{2}x \right| > -2$$

è limitato oppure no.

Per prima cosa occorre risolvere la disequazione con i moduli

$$x^2 - 2 \left| x^2 + \frac{1}{2}x \right| > -2,$$

poi occorre ragionare sull'insieme E delle sue soluzioni.

L'essere $|a| < b$ è equivalente a: $-b < a < b$. La disequazione diventa:

$$-2 \left| x^2 + \frac{1}{2}x \right| > -2 - x^2,$$

$$2 \left| x^2 + \frac{1}{2}x \right| < x^2 + 2,$$

$$\left| x^2 + \frac{1}{2}x \right| < \frac{x^2}{2} + 1,$$

$$-\frac{x^2}{2} - 1 < x^2 + \frac{1}{2}x < \frac{x^2}{2} + 1,$$

Devo quindi risolvere un sistema:

$$\begin{cases} -\frac{x^2}{2} - 1 < x^2 + \frac{1}{2} \\ x^2 + \frac{1}{2} < \frac{x^2}{2} + 1 \end{cases}$$

Risolvendo il sistema si ha $E = (-2, 1)$.

L'insieme E è limitato (in quanto lo è sia inferiormente che superiormente). Si ha: $\inf(E) = -2$, $\sup(E) = 1$, l'insieme non ha massimo o minimo.

9 L'equazione $|3x^2 - 5x - 2| + |x^2 - 4| = 0$:

a. non ha soluzioni reali

b. ha soluzione -2

c. ha soluzione 2

d. ha soluzioni $-2, 2, -\frac{1}{3}$

15.

10 La disequazione $|x^2 - x| > 6$ è equivalente a:

- a. $x^2 - x > 6 \forall x \in \mathbb{R}$ b. $\begin{cases} x^2 - x > 6 \\ x^2 - x < -6 \end{cases}$
16. c. $-6 < x^2 - x < 6$ d. $x^2 - x < -6 \vee x^2 - x > 6$

17. Risolvere la seguente **equazione esponenziale**: $\frac{9^{x-1}}{3^x} = 1$ *Scomporre tutto in fattori ed applicare le proprietà delle potenze*

18. Risolvere la seguente **disequazione esponenziale**: $\frac{9^x}{3^{x+1}} < 3^4$ *idem*

19. Risolvere la seguente **disequazione esponenziale con i moduli**: $2^x > 2^{|2x-1|}$

20. Calcolare $\log_2 4 - \log_2 16$ e $\frac{\log_2 16}{\log_2 8}$

21. Se $\log_7(\log_3(\log_2 x)) = 0$, quanto vale x ?

22. Risolvere le seguenti **disequazioni logaritmiche**, determinando anche il dominio:

$$\log_3(x^2 - 3x) < \log_3(x + 2)$$

$$\log_3(x^2 - 3) < 0$$

$$\log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{x}{2x+1}\right) \geq 0$$

23. Calcolare il valore della seguente **espressione goniometrica**:

$$2\operatorname{sen}\frac{\pi}{4}\cos\frac{\pi}{3} + 6\operatorname{sen}\frac{\pi}{6}\cos\frac{\pi}{3}\operatorname{tg}\frac{\pi}{6} - \cos\frac{\pi}{4}$$

24. Risolvere le seguenti **equazioni e disequazioni goniometriche** elementari:

a. $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$

f. $\tan x \geq -\frac{\sqrt{3}}{3}$

b. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$

g. $\operatorname{sen} x \geq \frac{\sqrt{2}}{6}$

c. $\tan x = \sqrt{3}$

h. $\cos 2x > -\frac{\sqrt{3}}{2}$

d. $\operatorname{sen} x \leq -\frac{\sqrt{2}}{2}$

i. $\operatorname{sen}\frac{x}{2} < \frac{\sqrt{3}}{2}$

e. $\cos x \leq -\frac{1}{2}$

25. Esercizio risolto: Risolvere la seguente disequazione goniometrica: $\frac{4\cos^2 x - 1}{\cos x} < 0$

Una disequazione fratta si risolve esaminando la positività del numeratore e del denominatore e poi studiando quali sono gli intervalli della retta reale in cui il loro prodotto soddisfa il segno della disequazione di partenza. Si ha :

$$4\cos^2 x - 1 > 0 \Rightarrow \cos^2 x > \frac{1}{4} \Rightarrow \cos x > \frac{1}{2} \cup \cos x < -\frac{1}{2} \Rightarrow$$

$$\frac{\pi}{3} < x < \frac{\pi}{2} \cup \frac{3\pi}{2} < x < \frac{5\pi}{3} \cup \frac{2\pi}{3} < x < \frac{4\pi}{3}$$

$$\text{e } \cos x > 0 \Rightarrow 0 < x < \frac{\pi}{2} \cup \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$$

Facciamo il grafico dei segni

$$\frac{\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \cup \frac{2\pi}{3} + 2k\pi < x < \frac{4\pi}{3} + 2k\pi \cup \frac{3\pi}{2} + 2k\pi < x < \frac{5\pi}{3} + 2k\pi.$$

Si ottiene che le soluzioni sono